

MANEJO PACIENTE INTOXICADO

TRIAJE

- Nivel 1: Síntomas graves
- Nivel 2: Síntomas leves o asintomáticos tras ingestas de alto riesgo
- Nivel 4-5: Nunca

Pruebas complementarias:

- Glucemia
- ECG
- Recogida muestras (no de forma rutinaria)

1.- VALORAR ABCD

- Estabilizar
- En caso de PCR prolongar RCP hasta 2 h

2.- VALORAR NIVEL DE CONSCIENCIA

2.1.- INCONSCIENTE

Administrar:

- Glucosa + tiamina
- Naloxona
- Flumacénilo

2.2.- CONSCIENTE

Anamnesis completa:

- Qué tóxico
- Cantidad
- Cuando
- Vía de administración

3.- INDICADA DESCONTAMINACIÓN

3.1.- NO

3.2.- SÍ (GENERALMENTE 2 H TRAS INGESTA)

Métodos principales:

- Carbón activo: dosis 1g/kg (50-100g) + importante vía aérea protegida
- Lavado intestinal: indicado si intoxicación por litio, hierro, etanol, medicación de liberación prolongada...

4.- VALORAR ADMINISTRACIÓN DE ANTÍDOTO



5.- VIGILANCIA DE COMPLICACIONES

- Convulsión: administrar Diazepam
- Hipotensión: administrar SF o RL
- Si riesgo de broncoaspirar: PLS

Sara Gale Zazu
Leire Urrutia Salinas